

# Танго утрово — чи це можливо?

Ми так давно не танцювали. «Раз-два-три-четири. Раз-два-три...» — заграв оркестр.

«Чотир-ррр-ррри» — простогнали мої суглоби

## ЖИТЯ У РУСІ

На жаль, чим старшою стає людина, тим більше «зношуються» її суглоби. Артроз та артрит належать до хронічних і прогресуючих захворювань суглобів, які частіше уражають людей старше 40–50 років. Тільки вдумайтесь в ці цифри — за поширеністю захворювання суглобів посідають друге місце після артеріальної гіпертензії (Насонова В.А., 2002). Для того, аби позбутися неприємних симптомів та повернутися (хоча б частково) до звичайного активного життя, пацієнтам доводиться тривало приймати лікарські засоби, іноді одночасно два-три препарати: знеболювальний, протизапальний, хондропротектор. А це, звісно, зовсім не зручно як з огляду на негативний вплив лікарських засобів на внутрішні органи, так і у плані фінансових витрат.

Ось чому варто звернути увагу на новий німецький препарат СУСТАМАР®, який представляє компанія esparma GmbH, Aristo Group (Німеччина).

## СУСТАМАР® — ТРИМАЙ РИТМ!

«Раз» — СУСТАМАР® — єдиний на фармацевтичному ринку України препарат, що містить екстракт мартинії духмяної у високій концентрації 480 мг. Це не просто хондропротектор. Дослідники довели **комплексний механізм протизапальної, знеболювальної і хондропротекторної дії** екстракту цієї рослини (Fiebich B.L. et al., 2012), чим не можуть похвалитися інші хондропротектори чи нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Останні навіть здатні викликати додаткове руйнування хрящів. Натомість, СУСТАМАР® не тільки гальмує руйнування внутрішньосуглобового хряща, але й сприяє його відновленню.

«Два» — серед багатьох засобів СУСТАМАР® вирізняється ще й науково доведеною ефективністю. Так, ґрутовні клінічні дослідження

довели, що завдяки прийому цього препарату **зменшується необхідність у застосуванні НПЗП та анальгетичних засобів** (Leblan D. et al., 2000), а в 60% випадків пацієнти взагалі можуть від них **відмовитися**.

«Три» — на відміну від НПЗП, СУСТАМАР® **легко переноситься** і не має негативного впливу на травний тракт і нирки. Відтак, курс лікування СУСТАМАРОМ може бути настільки тривалим, наскільки це потрібно кожному з пацієнтів — 1–3 місяці двічі на рік або протягом усього року поспіль, а за потреби і довше. Крім того, високий рівень безпеки надає провізору впевненості в своїй рекомендації. Адже тепер можна не хвилюватися з приводу поради, яку ви дали клієнту з остеоартрозом або артритом.

«Раз» — **зручний режим прийому** (двічі на добу) робить СУСТАМАР® препаратом вибору для людей усіх вікових груп та різної зайнятості.

«Два» — ефект від прийому СУСТАМАРУ є дозозалежним, тому для людей із більш вираженими боловими симптомами **можна підібрати відповідну дозу** СУСТАМАРУ — 2 таблетки двічі або тричі на добу.

«Три» — **СУСТАМАР® можна назвати одним із найдоступніших препаратів**, які чинять хондропротекторний ефект. Доступна ціна німецького лікарського засобу є напрочуд вигідною для пацієнтів, які тепер мають змогу отримувати якісне європейське лікування найвищого ґатунку. Водночас, ціна СУСТАМАРУ є прибутковою для аптечних закладів, адже дає їм можливість збільшувати товарообіг та заробляти, не відпускаючи клієнта із аптеки без необхідного препарату.

Із СУСТАМАРОМ тепер можливо майже все — **крокувати сходами, вільно рухатись, навіть танцювати!** І почали: пам-пам-пам-пам па-па-па-па пам-пам-пам-пам...

# СУСТАМАР®

Екстракт МАРТИНІЇ 480 мг

АРТРОЗ  
АРТРИТ  
ОСТЕОХОНДРОЗ

## Мрія суглобів!

- Новий німецький хондропротектор комбінованої дії
- Лікування дегенеративних та запальних захворювань суглобів
- Ефективність та безпека доведена ґрутовними дослідженнями

Дає змогу відмовитися від прийому НПЗП у 60%  
та ГКС у 56% пацієнтів з остеоартритом

\* Leblan J.M., Schäfer, D. Behandlung chronischer Arthrose mit Schrotextrakt am Beispiel der Martinia. Natura Med 16 (2001) № 5: 33-36. Інформація для медичного та фармацевтичного персоналу. Німеччина. НПЗП: Нестероїдні противавітамінні засоби. Гіпертензія: засоби для контролю артеріального тиску та периферичної перистенії. Хондроз: хондропротектори. Таблетки, виріт оболонкою. Показання для застосування: Захворювання, що супроводжуються болем у суглобах, артрит, гіпертензія, гіперхолістеринемія, хондроз, остеохондроз, або остеохондрози, як хондропротектор.