ДАЙДЖЕСТ

Преимущество использования препарата на основе экстракта ЗОЛОТАРНИКА в комплексном лечении рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей

Способность бактерий осуществлять адгезию к стенкам мочевого пузыря – фактор вирулентности, играющий важную роль в патогенезе инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В качестве одного из условий эффективного лечения рецидивирующих ИМП следует учитывать формирование биопленки, препятствующей осуществлению бактериальной адгезии.

На сегодняшний день имеются исследования, которые доказывают, что включение в схемы противорецидивной терапии препарата на основе экстракта ЗОЛОТАРНИКА, обладающего способностью ингибировать бактериальную адгезию, значительно улучшает результаты лечения хронических форм ИМП.

Целью такого исследования было сравнение эффективности комбинированной терапии (антибиотик + препарат на основе ЗОЛОТАРНИКА) и монотерапии антибиотиком в предупреждении рецидивов ИМП у женщин.

Методы. В исследовании приняли участие 164 женщины, страдающие рецидивирующими ИМП. В группу комбинированной терапии вошли 107 пациенток, в группу монотерапии – 57. В курсовом лечении применялся антибиотик фосфомицин (3 г 1 раз в неделю). Длительность противорецидивной терапии в обеих группах составила 3 месяца. В качестве

критериев эффективности проводимого лечения рассматривались количество рецидивов заболевания во время лечения и в течение года после его окончания, а также длительность безрецидивного периода.

Результаты. Отсроченное наблюдение за пациентками в течение года после завершения противорецидивного курса продемонстрировало, что комбинированное применение антибиотика и препарата на основе ЗОЛОТАРНИКА имеет значительное преимущество для эффективного предупреждения рецидивов заболевания по сравнению с монотерапией. Так, частота возникновения рецидивов в группе монотерапии антибиотиком была в 2,5 раза выше, чем в группе комбинированной терапии. Еще одним подтверждением лучшей эффективности комбинированной терапии является время безрецидивного периода. В группе монотерапии антибиотиком первый рецидив заболевания возникал в среднем уже через 3,6 месяца после прекращения терапии. Безрецидивный период в группе комбинированного лечения (антибиотик + экстракт ЗОЛОТАРНИКА) длился значительно дольше и составлял минимум 10 месяцев.

Выводы. Преимуществами использования препарата на основе ЗОЛОТАРНИКА в рамках противорецидивной терапии являются практически в 3 раза более длительный безрецидивный период и в 2,5 раза меньшее количество обострений. Таким образом, у пациентов с рецидивирующими ИМП, получающих препарат на основе экстракта ЗОЛОТАРНИКА, снижается потребность в использовании антибиотиков и значительно улучшается качество жизни.

Frumenzio E. et al. Role of phytotherapy associated with antibiotic prophylaxis in female patients with recurrent urinary tract infections. Arch Ital Urol Androl. 2013 Dec 31; 85 (4):197-199.

Подготовил **Игорь Кравченко**

ЦИСТО-АУРИН®

Экстракт ЗОЛОТАРНИКА 300 мг

Натуральна **АЛЬТЕРНАТИВА**
в лікуванні **інфекцій сечової системи**

- БІЛЬ тамує
- СПАЗМ знімає

- ЗАПАЛЕННЯ усуває
- АНТИБАКТЕРІАЛЬНУ дію чинить
E. coli, S. faecalis, S. aureus та ін.

Інформація для медичних та фармацевтичних працівників.

Склад: 1 таблетка містить екстракту трави золотарника звичайного 300 мг. **Завдання:** Еспанма ГмбХ, Німеччина. **Виробник:** Фарма Вернігероде ГмбХ, Німеччина. РП, № UA/13325/01/01. **Показання.** Санация сечовивідних шляхів при інфекційних та запальних процесах у складі комплексної терапії (цистит, пієлонефрит та ін.), при сечокам'яній хворобі та за наявності піску у нирках; профілактика утворення каменів та піску у нирках. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до золотарника звичайного або до інших складових лікарського засобу. Не рекомендується застосовувати при набряках, обумовлених серцевою або нирковою недостатністю. **Спосіб застосування та дози.** Дорослим і дітям віком від 12 років по 1 таблетці 4 рази на добу. **Побічні ефекти.** Рідко спостерігались алергічні реакції та інші. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування. Представництво «Еспанма ГмбХ» в Україні: вул., Р. Окіпної, 117, м. Київ.